

Recommandations concernant l'éviction (pré)scolaire en cas de maladies¹

MALADIES	SYMPTÔMES	RETOUR EN STRUCTURE
Angine virale	Maux de gorge Fièvre ou non Difficulté à déglutir	Disparition de la fièvre État général bon
Angine bactérienne (souvent le streptocoque)	Fièvre ou non Difficulté à avaler (mange et boit moins)	Disparition de la fièvre État général bon
Bronchiolite	Fièvre Toux et rhume Respiration rapide et sifflante Encombré par des sécrétions Muscles creusés entre les côtes et le cou	Disparition de la fièvre État général bon
Bronchite/Broncho-pneumonie	Fièvre Toux persistante grasse ou sèche (parfois les quintes provoquent des vomissements) Respiration parfois sifflante, râles ronflants	Disparition de la fièvre État général bon
Conjonctivite virale ou bactérienne (95% des cas)	Yeux rouges et écoulement clair et abondant. Sécrétions jaunes et purulentes (conjonctivite bactérienne)	Après 24 heures de traitement antibiotique si conjonctivite bactérienne. État général bon.
Conjonctivite épidémique à adénovirus	Rougeur et enflure de la conjonctive (blanc de l'œil) et des paupières Larmolement Fièvre, rhume	15 jours suivant le début de la maladie
Coqueluche	Température normale ou subfébrile	Structures d'accueil avec nourrissons de moins de 6 mois : Dès le 6 ^e jour après le début du traitement antibiotique.

¹ Tiré de recommandations concernant l'éviction (pré)scolaire en cas de maladies transmissibles et de parasitose, (mai 2020). Association des médecins cantonaux de Suisse.

<p>Déclaration obligatoire auprès du médecin cantonal (généralement médecin traitant)</p>	<p>Toux sèche avec un bruit aigu appelé « Cri du coq » Quintes de toux accompagnées de rougeurs aux joues La crise est souvent suivie de vomissements Attention aux bébés de moins de 6 mois.</p>	<p>Ou sans antibiotiques : dès le 22^e jour suivant le début de la toux. Ou dès exclusion formelle du diagnostic.</p> <p>Personnes en contact étroit présentant des symptômes : jusqu'au 21^{ème} jour après le dernier contact avec la personne malade.</p> <p>Sans symptôme : traitement préventif aux antibiotiques recommandé si le dernier contact a eu lieu il y a moins de 21 jours :</p> <p>Nourrissons de moins de 6 mois (si pas vaccinés 2X contre la coqueluche)</p> <p>Membres non immunisés de la famille de nourrissons de moins de 6 mois</p> <p>Femmes enceintes d'au moins 6 mois non immunisées Personnes non immunisées en contact avec des nourrissons de moins de 6 mois au sein de l'établissement.</p>
<p>Covid-19</p>	<p>Frissons Rhume, toux, mal de gorge Perte du goût et de l'odorat</p>	<p>Les mesures sont basées sur les recommandations de l'OFSP.</p>
<p>Erythème infectieux (5^e maladie)</p>	<p>Rhume Fièvre Mal de gorge Plaques rouges sur les joues</p>	<p>Disparition de la fièvre État général bon Femme enceinte en contact : prévenir son médecin.</p>
<p>Gale</p>	<p>Boutons de type nodules ou pustules sur les mains, les pieds, les creux axillaires, parfois le visage et le dos Fortes démangeaisons</p>	<p>Retour possible dès l'instauration du traitement, soit 24h après / ou après exclusion formelle du diagnostic. Avertir les parents des enfants du même groupe de consulter en cas de symptômes dans les 5 semaines qui suivent.</p> <p>Δ Les personnes vivant sous le même toit doivent faire l'objet d'un traitement.</p>
<p>Grippe</p>	<p>Fièvre, frissons Rhume, toux, mal de gorge</p>	<p>Disparition de la fièvre État général bon</p>

Herpès	Boutons de fièvre, éruption de petites vésicules transparentes et/ou purulentes, il y a souvent des aphtes dans la bouche et fièvre chez le petit enfant	État général bon Éviter tout contact labial et observer les mesures d'hygiène.
Hépatite A <i>Transmissible par les selles et les mains souillées</i> Déclaration obligatoire auprès du médecin cantonal (généralement médecin traitant)	Jaunisse, maux de ventre, diarrhée, vomissements et refus alimentaire	Retour possible dès 6 jours après le début des diarrhées et/jaunisse pour l'hépatite A.
Hépatite B et C <i>Transmissible par le sang et les voies sexuelles</i>	Jaunisse, maux de ventre, diarrhée, vomissements et refus alimentaire	Pas de mesures particulières. État général bon
Infections gastro-intestinale	Vomissements Diarrhées	État général bon Éviction d'un enfant lorsque les vomissements et les diarrhées se reproduisent plusieurs fois ou lorsque la structure ne peut pas appliquer les mesures d'hygiène nécessaires. Δ Attention à la déshydratation de l'enfant.
Muguet (buccal)	Difficulté à avaler Plaques ou cercles blancs dans la bouche, à l'intérieur des joues	État général bon
Oreillons	Fièvre (pouvant atteindre 40°) Difficulté à avaler Douleurs en avant de l'oreille Inflammation des glandes salivaires	Disparition de la fièvre État général bon Risque de complications pour homme adulte non-vacciné
Otite	Douleur au niveau des oreilles, accentuée en position horizontale Fièvre Se réveille la nuit	Disparition de la fièvre État général bon

Poux	Fortes démangeaisons ou prurit, au niveau du cuir chevelu, de la nuque et des tempes, qui apparaissent généralement 2 à 6 semaines après la contamination	État général bon + instauration du traitement Vérifier et laver tous les textiles.
Rougeole Déclaration obligatoire auprès du médecin cantonal (généralement médecin traitant)	Fièvre Plaques/tâches rouges sur le front, les joues, la racine des cheveux et derrière les oreilles, puis 2-3 jours après elles s'étendent sur tout le corps	Selon certificat médical. Éviction et confinement à domicile. Retour en structure dès le 5 ^{ème} jour suivant le début de l'exanthème (éruption cutanée) État général bon Personne non vaccinée en contact : éviction jusqu'au 22 ^{ème} jour suivant le dernier contact Personne vaccinée en contact : pas d'éviction
Roséole (fièvre des 3 jours)	Forte fièvre durant 3-4 jours (40°) Dès la chute de la fièvre, apparition de petits boutons sur le tronc puis partout	Disparition de la fièvre État général bon
Rubéole Déclaration obligatoire auprès du médecin cantonal (généralement médecin traitant)	Légère fièvre Toux Pharyngite Minuscules boutons rouges	Disparition de la fièvre État général bon Δ Femme enceinte non vaccinées, attention.
Scarlatine Cf angine à streptocoques	Fièvre (39-40°) Angine rouge et douloureuse Langue framboisée	Disparition de la fièvre État général bon
Tuberculose Déclaration obligatoire auprès du médecin cantonal (généralement médecin traitant)	Toux Sensation de faiblesse Légère fièvre Perte de poids, manque d'appétit Douleurs dans la poitrine	Selon certificat médical État général bon
Varicelle	Minuscules cloques contenant du liquide clair	État général bon

	Cela débute sur la tête, derrière les oreilles, sur le thorax puis cela s'étend sur tout le corps	Δ Femmes enceintes qui ne l'ont jamais eue + enfants immunosupprimés, attention.
Virus pied-main-bouche	Fièvre ou non Petits ulcères douloureux dans la bouche Petits boutons principalement sur la paume des mains et la plante des pieds	Disparition de la fièvre si fièvre État général bon